

► Cabinet d'Orthodontie du Docteur Jany CHARBIT

Orthodontiste à SUCY EN BRIE

📍 1 avenue Winston Churchill 94370 SUCY EN BRIE

☎ Tel. : +33 1 45 90 27 27

🌐 dr-jany-charbit.chirurgiens-dentistes.fr

Dégagement orthodontique d'une canine incluse

Les canines ont parfois du mal à prendre leur place sur l'arcade dentaire et il arrive qu'elles ne puissent pas se positionner correctement.

Si l'évolution d'une canine n'est plus possible, elle reste bloquée et l'on appelle ce phénomène la canine incluse. Son parcours peut être dévié vers l'extérieur (côté de la joue) ou à l'intérieur vers le palais.

L'une des causes possibles de cette inclusion est le maintien d'une dent temporaire qui aurait dû tomber. La canine n'a pas réussi à ronger la racine de la dent de lait.

CONSÉQUENCES DE L'INCLUSION

- Présence d'un espace entre l'incisive latérale et la prémolaire. Cet espace va partiellement diminuer au fil du temps, mais la situation ne fera que s'aggraver dans le futur.
 - Usure dentaire résultant de cette malocclusion mais également, par un effet domino, d'autres désordres au niveau de l'arcade.
- La désinclusion doit alors se faire à l'aide d'un traitement orthodontique.



ÉTAPES DE LA DÉSINCLUSION

- Dégagement chirurgical de la gencive puis de l'os qui recouvre la canine.
- Fixation d'un système de traction sur la canine pour la guider vers la position recherchée.
- Quand la canine est assez descendue vers l'arcade, la ligature et l'attache sont retirées.
- La canine se place peu à peu sur l'arcade dentaire.

À SAVOIR

Plusieurs facteurs peuvent influencer le résultat du traitement : sévérité de l'inclusion, âge du patient et sa motivation.

Un examen préalable, approfondi, est à effectuer avec votre orthodontiste afin de déterminer la solution la plus appropriée.